

How to grow melon

Growth stage	Age tuổi	Item	Method	Note (lưu ý)
		Land preparation làm đất	Tillage (chuẩn bị đất): 1. Dry soil 7-14 days: phơi đất 7 – 14 ngày 2. Sow lime or Dilomite 300 Kgs/ Ha bón vôi hay dilomite 300 kg/ha 3. Interval (khoảng cách trồng): Between tree 50 cm (cây cách cây 50 cm. Between row 1 m (hàng cách hàng 1 m. 4, Support (bón bổ sung): Fertilizer(phân) 15-15-15 1 spoon(muối) + 46-0-0 ½ spoon(muối) 5. PREPARING SOIL, COVER PLASTIC LAØM ÑÁÁT, TRÁUÍ BAÏT, ÑUÏC LOẢ	Water system depend on suitable land
		Seeding: cây con	Take a seed into warm water 24 Hours then wrapped in wet cloth 24 Hours Ngâm hạt vào nước ấm 24 giờ sau đó ủ trong khăn ướt 24 giờ	
Seeding: cây con	- 8	A seedling to transplanting: cây con để cấy ra ruộng	1.Take a root seeding 0.5 cm. to tray or bag Cấy hạt nảy mầm 0.5 cm. vào khay hay bầu ươm 2.Primary leaf 2 leaf: cây có 2 lá thật 3. Keep soil or material with root: vẫn giữ đất và giá thể theo khi cấy ra 4. Handle seedlings gently: đưa cây con ra nhanh chóng	vào nước 2 Lần / ngày
ระยะการ เจริญเติบโต ก่อนดอก บาน	0	Transplanting to grave: cấy ra líp	1. Take water into grave before transplanting 1 day: tưới nước lên líp 1 ngày trước khi cấy ra 2. Take a seedling from tray into grave immediately deep 10 cm: trồng cây con sâu	1.Transplanting in low temperature: cấy cây ra ruộng khi trời mát /2, Take water after transplanting date 2- 3 days: tưới nước lại sau khi trồng 3 ngày.

			10 cm càng nhanh càng tốt sau khi lấy ra khỏi khay	
	5	ทำค้ำ	ใช้ไม้ค้ำปักต้นละ 1 อัน แล้วใช้เชือกผูกปลายไม้เป็นค้ำไขว้กันและมีไม้ราวผูกยึดเป็นแนวยาวระหว่างไม้ค้ำแต่ละหลัก	
	7	Control measures: phòng ngừa 1	Spray (phun) disease (bệnh) + Insect: sâu	
	13	Fill Fertilizer (Bón phân) 1	fertilizer 15 - 15 - 15 : 46-0-0 ratio 3:1 phân NPK tỉ lệ 15-15-15 : 46-0-0 , 3 : 1	
	14	Control measures: phòng ngừa 2	Spray (phun) disease (bệnh) + Insect: sâu	
	15	cut branch (cắt nhánh) 1	Keep main stem and cut branch under branch no.9 Giữ lại 1 dây chính và cắt nhánh tỉ lệ 9 xuống	
	17	Round top (bó lại) 1	Round top (bó lại trên ngọn cây)	
	19	Round top (bó lại) 2	Round top (bó lại trên ngọn cây)	
	20	Fill Fertilizer (Bón phân) 2	phân NPK tỉ lệ 15-15-15	
	21	1 Round top(bó lại) 3 2. Control measures: phòng ngừa 3	1. Round top (bó lại trên ngọn cây) 2. Spray (phun) disease (bệnh) + Insect: sâu	
	22	cut branch (cắt nhánh) 2	cắt nhánh tỉ lệ 9 xuống	
	24	Round top (bó lại) 4	Round top (bó lại trên ngọn cây)	
ระยะการเจริญเติบโตหลังดอกบาน	25	1. ดอกเริ่มบาน 2. cut branch (cắt nhánh) 3	1. ดอกตัวเมียในแขนงที่ 9 เริ่มบาน 2. โดยให้เหลือแขนงที่ 9-13ไว้ แขนงที่ต่ำกว่าข้อที่ 9 และสูงกว่าข้อที่13ให้ตัดออก	
	28	Control measures: phòng ngừa 4	Spray (phun) disease (bệnh) + Insect: sâu	
	30	Fruit cover	Keep 1 best fruit (Giữ lại 1 trái cây)	

32	Round top (bó lại) 5	Round top (bó lại trên ngọn cây)	
34	Fill Fertilizer (Bón phân) 3	fertilizer 13 - 13 - 21 phân NPK tỉ lệ 13-13-21	Make bigger fruit (làm cho trái lớn)
35	Control measures: phòng ngừa 5	Spray (phun) disease (bệnh) + Insect: sâu	
38	1 cut branch (cắt nhánh) 4 2. เต็ดยอด	1. แต่งแขนงที่อยู่สูงกว่าผลที่ห่อไว้ ออกให้หมด จนถึงยอด 2. Cut top	
42	Control measures: phòng ngừa 6	Spray (phun) disease (bệnh) + Insect: sâu	
44	Fill Fertilizer (Bón phân) 4	fertilizer 13 - 13 - 13 : 0-0-60 ratio 1:4 phân NPK tỉ lệ 13-13-13 : 0-0-60 , 1 : 4	Make bigger fruit and sweet (làm cho trái lớn và ngọt)
55	thu hoạch		